

Документ. 4 Оценка на риска в лечебните заведения.

	Вид експозиция	Пример	Мерки в обществото
Високорискови контакти	Обслужване на пациент или присъствие в помещение при извършване на процедури с риск от наличие на висока концентрация на издишан аерозол при НЕ използване на всички лични предпазни средства или при близък контакт с пациент с доказан COVID-19 (който не носи хирургическа маска)и НЕ носене на респираторна маска от медицинското лице	Медицински персонал, който не носи всички препоръчани лични предпазни средства, но е извършил взимане или е присъствал на взимане на назофарингеален или орофарингеален секрет	-Карантина в дома -Да се освободи от работа -Активно следене за симптоми в период на 14 дни от контакта
Средно-високорискови контакти	Продължителен контакт (≥15 мин.) с пациент с лабораторно потвърден COVID-19 или с неговите секрети или екскрети без използване на всичките препоръчителни лични предпазни средства	Проверка на жизнените показатели и взимане на кръв на пациент с маска, докато медицинското лице е с хирургична маска и ръкавици	-Да се освободи от работа -Активно следене за симптоми в период на 14 дни от контакта
Среднорисков и контакти	Повече от кратък контакт (>1-2 мин.) с пациент с лабораторно доказан COVID-19 или с неговите секрети и екскрети без прилагане на всички препоръчани лични предпазни средства, когато не е в категорията висок риск и средно висок риск	Преглеждане на пациент за 5 мин., докато се носят маска, изолационно облекло и предпазен лицев шлем (но без респираторна маска)	-Да се освободи от работа -Активно следене за симптоми в период на 14 дни от контакта
Нискорискови контакти	Всеки контакт с пациент с лабораторно потвърден COVID-19, докато се използват всички препоръчани лични предпазни средства; кратко взаимоотношение с пациент (1-2 мин.), което не включва директен контакт , при което НЕ се използват всички препоръчани лични предпазни средства или работа на едно и също място и по едно и също време с колега с доказан COVID-19, но без да е уточнено дали са били в едно помещение	Преглед на пациент, ако се носят всички необходими лични предпазни средства;	-Активно следене за симптоми в период на 14 дни от контакта
Нерискови контакти	Всеки контакт, който не спада в посочените по-горе категории	Разминаване с пациенти по коридора	Няма

Източник: Разработен от „Members of the Illinois COVID-19 Investigation Team” с консултация от Американския Център за превенция и контрол на заболяванията (CDC, Atlanta) и публикувано в: Isaac Ghinai, Tristan D McPherson, Jennifer C Hunter et al. First known person-to-person transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in the USA. Lancet. Published **Online** March 12, 2020 [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30607-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30607-3)